

Białkomocz ortostatyczny pojawia się w późnym dziecięctwie lub w wieku dojrzewania. Pojawia się jedynie po dłuższym przebywaniu w pozycji stojącej. Ustępuje pod koniec wieku dojrzewania i ma łagodny przebieg.

WYKONANIE TESTU NA BIAŁKOMOCZ ORTOSTATYCZNY U DZIECI:

1. Dziecko powinno opróżnić pęcherz moczowy tuż przed położeniem się spać. Nie powinno wstawać w nocy, gdyż może to zakłócić wynik testu; jeśli wstanie, powinno ponownie oddać mocz.
2. Rano dziecko powinno być obudzone przez rodziców i oddać natychmiast mocz do specjalnego naczynka laboratoryjnego, zanim podejmie jakąkolwiek aktywność.
3. Celem pobrania próbki jest zbadanie moczu, który został wyprodukowany podczas snu w pozycji leżącej.
4. Jeśli dziecko cierpi na białkomocz ortostatyczny próbka moczu poddana analizie będzie miała wynik negatywny, gdyż mocz pobrany bezpośrednio po przebudzeniu nie miał czasu zarazić się moczem wyprodukowanym w przedłużającej się pozycji pionowej.

Zanieś próbkę moczu do laboratorium i zgłoś się na odczyt wyniku do lekarza rodzinnego. Jeśli masz wątpliwości co do jakości pobrania próbki, zgłoś to lekarzowi podczas konsultacji. Badanie moczu wykluczy infekcję oraz obecność białkomoczu (stosunek do normy). Skierowanie na badanie moczu do pobrania na stronie www.nephrologue.be w zakładce "potrzebne dokumenty".

Pieczęć lekarza

Data wizyty lekarskiej