



FORXIGA - JARDIANCE:

un médicament qui fait uriner du sucre.

L'utilité des inhibiteurs de SGLT2 (gliflozines) dans la protection des reins,

conseil au patient.

Votre médecin vous a prescrit un médicament appartenant à la classe des inhibiteurs de SGLT2 (comme la dapagliflozine ou l'empagliflozine). Ce traitement aide à protéger vos reins, surtout si vous êtes atteint(e) de diabète ou d'insuffisance rénale. Il agit en réduisant la quantité de sucre réabsorbé par les reins, ce qui diminue la pression sur ces organes et ralentit leur dégradation.

Voici quelques Conseils de prudence :

-Baisse de la tension artérielle : Ce médicament peut faire baisser votre tension. Levez-vous doucement après être resté(e) assis(e) ou allongé(e) pour éviter les étourdissements. Si votre tension est trop basse le traitement devra être revu par votre équipe médicale

- Risque **d'infections urinaires** : Une vigilance est nécessaire face aux signes d'infection urinaire (brûlures en urinant, besoin fréquent d'uriner, douleurs au bas du ventre). Signalez tout symptôme à votre médecin.

- **Infections cutanées** : Un petit risque accru d'infections au niveau des parties intimes peut survenir. Maintenez une bonne hygiène et consultez en cas de rougeurs, démangeaisons ou douleurs inhabituelles. (mycose).

suivez régulièrement les conseils de votre professionnel de santé.